



**Клинические рекомендации
по неинвазивным методам лечения кариеса**
Отчет Американской Стоматологической Ассоциации, 2018

Клинические рекомендации составлены на основе имеющихся в MEDLINE и Embase via Ovid, Cochrane CENTRAL данных литературы, имеющих доказательную базу, а также на основе базы данных систематических обзоров Cochrane.

Вид лечения	Временные зубы	Постоянные зубы
Купирование кариозных поражений, протекающих с образованием полости, в области коронки	Вместо еженедельного использования фторидсодержащего лака (5% NaF) в течение 3-х недель следует отдавать предпочтение использованию 38% раствора фторида диамин серебра дважды в год	
Лечение начальных кариозных поражений в области коронок временных и постоянных зубов	Окклюзионная поверхность	
	Вместо использования фторидсодержащего лака (5% NaF) каждые 3-6 месяцев, 1,23% APF каждые 3-6 месяцев, инфильтрации поверхности в сочетании с фторидсодержащим лаком (5% NaF) при аппликациях каждые 3-6 месяцев или ополаскивателя 0,2% NaF 1 раз в неделю следует отдавать предпочтение использованию герметиков в сочетании с фторидсодержащим лаком (5% NaF) с аппликациями каждые 3-6 месяцев или только герметиков каждые 3-6 месяцев	Вместо использования фторидсодержащего лака (5% NaF) каждые 3-6 месяцев, 1,23% APF каждые 3-6 месяцев, ополаскивателя 0,2% NaF 1 раз в неделю, следует отдавать предпочтение использованию каждые 3-6 месяцев герметиков в сочетании с фторидсодержащим лаком (5% NaF) или только герметиков
	Апроксимальные поверхности	
	Рекомендовано использование: <ul style="list-style-type: none"> • фторидсодержащего лака (5% NaF) каждые 3-6 месяцев; • метода инфильтрации; • сочетания метода инфильтрации и аппликации фторидсодержащего лака (5% NaF) каждые 3-6 месяцев; • герметиков 	Рекомендовано использование: <ul style="list-style-type: none"> • фторидсодержащего лака (5% NaF) каждые 3-6 месяцев; • метода инфильтрации; • сочетания метода инфильтрации и аппликации фторидсодержащего лака (5% NaF) каждые 3-6 месяцев; • герметиков
	Вестибулярная/язычная поверхность	
	Рекомендовано использование: <ul style="list-style-type: none"> • аппликации 1,23% APF каждые 3-6 месяцев; • фторидсодержащего лака (5% NaF) каждые 3-6 месяцев 	Рекомендовано использование: <ul style="list-style-type: none"> • аппликации 1,23% APF каждые 3-6 месяцев; • фторидсодержащего лака (5% NaF) каждые 3-6 месяцев
При доступности фторидсодержащих средств, герметиков и возможности инфильтрации не рекомендовано использование 10% CPP-ACP		
Купирование и восстановление поверхности начальных кариозных поражений и кариозных поражений с образованием полости в области корня постоянных зубов		Вместо использования фторидсодержащего лака (5% NaF) каждые 3-6 месяцев, ежегодной аппликации 38% SDF в сочетании с раствором или аппликации 1% хлоргексидина с 1% тимоловым лаком каждые 3-6 месяцев следует отдавать предпочтение гелю 1,1% NaF или зубной пасте 5000 ppm (минимум 1 раз в день).



1. Код ICDAS 1-2

2. Код ICDAS 5-6

3. Аппликации каждые 3-6 месяцев

4. Порядок лечения, включенный в рекомендации, определен экспертной группой с учетом эффективности лечения, возможности его проведения, пожеланий, предпочтений пациентов, их особых потребностей, страхового статуса и доступности ресурсов

5. Домашнее использование 1 раз в неделю

6. Аппликации дважды в год

7. В соответствии с концепцией информированного согласия всем пациентам следует предлагать все виды возможного лечения и разъяснять их потенциальные побочные результаты (например, окрашивание поверхности поражений в черный цвет при использовании SDF)

8. Ежегодные аппликации

9. Домашнее использование минимум 1 раз в день